

Vancomycinrezisztens Enterococcusok megjelenése sebészeti intenzív osztályon

Szabó Marcell dr.¹ ■ Bozó Anna dr.¹ ■ Soós Sándor dr.¹
Darvas Katalin dr.^{1,2} ■ Harsányi László dr.¹ ■ Csomós Ákos dr.²

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, ¹I. Sebészeti Klinika,
²Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest

Bevezetés: Az Enterococcusok növekvő antibiotikum-rezisztenciájukkal jelentős kórokozók az intenzív osztályokon; a törzsek új kihívást jelentenek. **Célkitűzés:** A szerzők célja a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikájának intenzív osztályán a vancomycinrezisztens törzsek halmozott előfordulása kapcsán szerzett tapasztalok ismertetése. **Módszer:** Eset-kontroll tanulmányban 2013. január 1. és június 30. közötti időszakban vizsgálták az Enterococcus-incidenciát mikrobiológiai mintákban és a vancomycinrezisztens Enterococcusokkal kezelt betegek demográfiai, kórházi tartózkodási, mortalitási adatait. **Eredmények:** 114 betegnél azonosítottak Enterococcusot, közülük 14-nél vancomycinrezisztens törzset. Az Enterococcus-incidencia a vancomycinrezisztens izolátumok megjelenése előtti és utáni időszakok között nem változott. A demográfiai adatokban sem találtak különbséget a két csoport között. A vancomycinrezisztens Enterococcusokat hordozó betegek halálához meghaladta a vancomycinérzékeny Enterococcusok jelenlétében észleltet (42,9% vs. 30,0%; $p = 0,005$), a kórházi tartózkodás ideje azonban nem különbözött. A vancomycinrezisztens csoportban a társbetegségek, valamint az akut műtétek gyakoribbak voltak. **Következtetések:** A vancomycinrezisztens Enterococcusok jelenlétében észlelhető magasabb halálozás felhívja a figyelmet a megelőzés és infekciókontroll jelentőségére, de a vancomycinrezisztencia oki szerepe kérdéses a nagyobb mortalitásban. Orv. Hetil., 2015, 156(19), 779–784.

Kulcsszavak: vancomycin, Enterococcus, vancomycinrezisztens Enterococcus, intenzív, sebészet

Outbreak of vancomycin-resistant enterococci in a surgical intensive care unit

Introduction: Enterococci have increasing importance in intensive care units, and vancomycin-resistant strains express a new challenge. **Aim:** The aim of the authors was to present their findings obtained from the first vancomycin-resistant enterococci outbreak occurred in 2013 at the Intensive Care Unit of the 1st Department of Surgery, Semmelweis University. **Method:** This was a case-control study of patients who had Enterococci species isolated from their microbiological samples between January 1 and June 30, 2013. Changes of Enterococcal incidence and consequences of vancomycin-resistance in patient outcome were analyzed. Demographic data, hospital length of stay and mortality data were also collected. **Results:** Enterococci were isolated from 114 patients and 14 of them had vancomycin-resistant strains. The incidence of Enterococcal strains was not different in the periods before and after the outbreak of the first vancomycin-resistant Enterococci. Patients with vancomycin-resistant Enterococci had significantly higher mortality rate than those with vancomycin-sensitive Enterococcus (42.9% vs 30.0%, $p = 0.005$); however, length of stay was not significantly different. Co-morbidities and emergency surgery were significantly higher in patients who had vancomycin-resistant Enterococci. **Conclusions:** The higher mortality observed in patients with vancomycin-resistant Enterococcus infections highlights the importance of prevention and appropriate infection control, however, the direct relationship of vancomycin-resistance and increased mortality is questionable.

Keywords: vancomycin, enterococcus, vancomycin-resistant enterococcus, intensive care, surgery

Szabó, M., Bozó, A., Soós, S., Darvas, K., Harsányi, L., Csomós, Á. [Outbreak of vancomycin-resistant enterococci in a surgical intensive care unit]. Orv. Hetil., 2015, 156(19), 779–784.

(Beérkezett: 2015. február 6.; elfogadva: 2015. március 19.)

Rövidítések

PBP4, -5 = (penicillin binding protein) penicillinkötő fehérje; SOFA = Sequential Organ Failure Assessment; VRE = vancomycinrezisztens *Enterococcus*; VSE = vancomycinérzékeny *Enterococcus*

A nosocomialis infekciók jelenléte vagy hiánya a betegbiztonság fontos meghatározója. Tudott tény az is, hogy az intenzív osztályokon kezelt betegek halmozottan hordozzák a nosocomialis infekciók ismert rizikófaktorait. Ennek oka, hogy a többszervi elégtelenség okozta súlyos állapot, valamint a kezeléshez szükséges számos invazív eszköz esendővé teszi őket mind a Gram-pozitív, mind a Gram-negatív kórokozókkal szemben [1]. A multirezisztens baktériumok (ideértve az extrém rezisztens és pánrezisztens törzseket is) intenzív osztályos jelenléte változó mértékben, de univerzális jelenség [1, 2, 3], az általuk okozott infekciók sokszor rossz prognózisúak, a halálozás rizikója többszörös lehet [2]. Terjedésük naponta állítja az intenzív osztályos infekciókontrollt komoly feladatok elé, a kezeléshez szükséges antibiotikumok költségvonatával pedig jelentős anyagi terhet ró az egyes osztályokra.

Az *Enterococcus*ok (elsősorban *E. faecalis* és *E. faecium*) húgyúti, intraabdominalis, seb-, véráramfertőzések, esetenként endocarditisek kórokozói lehetnek. Speciális penicillinkötő fehérjéiknek (PBP4, -5) köszönhető veleszületett cefalosporinrezisztenciájuk mellett gyakori körükben a szerzett rezisztencia egyéb antibiotikumra, például aminopenicillinekre, aminoglikozidokra, esetleges glikopeptidrezisztenciájuk sem új keletű jelenség [4, 5]. A glikopeptidek elleni védelmet a *vanA*, illetve a *vanB* rezisztenciagén hordozása biztosítja, utóbbi esetén teicoplaninra a baktériumok érzékenyek maradnak. A *vanA*-hordozás lényegesen gyakoribb az *E. faecium*ok körében [4]. Bár az Egyesült Államokban kifejezetten elterjedtek, egyes felmérésekben az *E. faecium*ok 60%-a nem érzékeny vancomycinre [6]. Magyarországon a legutóbbi időkgig a vancomycinrezisztens *Enterococcus* törzsek (VRE) nem jelentettek releváns problémát: 2012-ben az intenzív osztályokról izolált törzsek csak 0,1%-a, 2013-ban pedig 0,2%-a bizonyult rezisztensnek. Aggasztó ugyanakkor, hogy az *E. faecium*ok között a rezisztens törzsek aránya egy év alatt megnégyszereződött (1,6-ről 6,2%-ra emelkedett), és több hazai intenzív osztály szembesült a VRE jelentette problémával [7, 8]. Az *E. faecalis*ok túlnyomórészt megtartották érzékenységüket a vancomycinre, ennek hátterében valószínűleg legalább részben a megszorodó *C. difficile*-colitisek miatti egyre jelentősebb antibiotikum-nyomás állhat [9, 10].

Klinikánk intenzív osztályán a 2013. év elején észleltünk először ilyen izolátumokat, március 25-től április 23-ig halmozottan, ezért járványügyi intézkedések váltak szükségessé. A korábbiakat jelentősen meghaladó VRE-incidencia indokolta, hogy részletesen felmérjük a kórokozók elterjedését, esetleges kóroki, valamint prog-

nosztikai jelentőségét, mivel ezzel kapcsolatosan hazai adat ez idáig minimálisan állt rendelkezésre.

Jelen retrospektív, eset-kontroll vizsgálatunkban célunk az volt, hogy elemezzük, a növekvő VRE-incidenciát követi-e az *Enterococcus*ok gyakoriságának változása, a VRE jelenléte pedig milyen kimenetelbeli változással jár együtt a vancomycinre érzékeny *Enterococcus* (VSE) törzsek hatásával összevetve.

Módszer

Betegek

A Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikájának intenzív osztályán 2013. január 1. és június 30. között kezelt betegek adatait tekintettük át. A vizsgálatban azoknak a betegeknek az adatait értékeltük, akiknek a vizsgált időszak során bármely, az intenzív osztályos kezelésükkel összefüggően levett mikrobiológiai mintájukból *E. faecium* vagy *E. faecalis* tenyésztett ki. Minden beteget csak egyszer, a legelső tenyésztési eredménnyel szerepeltettünk.

Mikrobiológiai adatok

A mikrobiológiai adatokat a Semmelweis Egyetem Kórházhigiénés Osztálya összesítve bocsátotta rendelkezésünkre. A VSE- és a VRE-izolátumok elkülönítése fenotípus szerint, antibiogram alapján történt. Kifejeztük az *Enterococcus* species (VRE és VSE együtt), valamint a VRE-izolátumok gyakoriságát az egyes hónapok során az összes pozitív tenyésztési eredmény arányában. Azonos betegnél észlelt együttes VRE- és VSE-előfordulás esetén a beteg adatait a továbbiakban a VRE-csoportnál vettük figyelembe.

Demográfiai adatok és társbetegségek

Kigyűjtöttük a betegek nemét, életkorát, a társbetegségeiket (diabetes mellitus, hypertonia, COPD, krónikus veseelégtelenség, malignus betegség), *C. difficile* társinfekció esetleges jelenlétét, illetve a pozitív tenyésztés napjáig végzett esetleges akut műtétet, a kórházi ápolás hosszát a pozitív tenyésztést megelőzően és követően. Az egyes társbetegségeket anamnézis alapján rögzítettük, illetve a műtét előtti kivizsgálás során frissen felismert eseteket vettük figyelembe. Krónikus veseelégtelenséget 177 $\mu\text{mol/l}$ feletti premorbid kreatininszint esetén vettünk figyelembe. A malignus betegséget, a sebészeti műtétet szükségessé tevő alapterbetegségen túl, abban az esetben is dokumentáltuk, ha a beteg a jelen felvételétől függetlenül a megelőző egy évben daganatos betegség miatt kezelést igényelt. *C. difficile*-infekciót a beválasztás alapjául szolgáló (*Enterococcus* speciesre) pozitív tenyésztés napjáig levett székletminta (A-toxin) szerológiai vagy tenyésztési eredménye (toxintermelő

1. táblázat | A két betegcsoport jellemzői, társbetegségeik és az akut műtétek aránya százalékban (zárójelben a betegek száma)

	VRE (n = 14)		VSE (n = 100)		p
Kor	68,4±6,6 év		66,5±14,0 év		0,089
Férfi	68,8		52,0		0,001
HT	(8)	57,1	(63)	63,0	0,225
DM	(5)	36,7	(29)	29,0	0,139
Szívélgtelenség	(4)	28,6	(17)	17,0	0,002
KVE	(0)	0,0	(5)	5,0	0,022
COPD	(3)	21,4	(12)	12,0	0,004
CDI	(3)	21,4	(8)	8,0	<0,001
Malignus betegség	(6)	42,9	(58)	58,0	0,002
Akut műtét	(12)	85,7	(40)	40,0	<0,001
Megelőző kórházi tartózkodás	14 nap (IQR: 9–19)		11 nap (IQR: 4–19)		0,796

CDI = *C. difficile*-infekció; DM = diabetes mellitus; HT = hipertonia; KVE = krónikus vesecélgtelenség.

törzs) alapján diagnosztizáltunk. Akut műtétet a felvételt szükségessé tevő akut sebészeti műtét esetén, illetve a pozitív tenyésztés napjáig esetlegesen szükséges sürgős reoperáció esetén dokumentáltunk. Felmértük a kórházi felvétel és a pozitív mikrobiológiai minta levételéig eltelt időt.

Állapotsúlyosság

A betegek állapotsúlyosságát a Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) pontrendszer [11] szerint értékeltük az első VRE-re vagy VSE-re pozitív mikrobiológiai minta levételének napján.

Kimeneteli jellemzők

Betegeink betegségkimenetelét a bevasztás alapjául szolgáló pozitív tenyésztési eredményt követő kórházi tartózkodásuk időtartamával (napok száma), valamint a 60 napon belüli mortalitás meghatározásával jellemeztük.

Statisztikai elemzés

Az eredményeket normálosztás esetén átlagértékkel és szórással, nem normális eloszlásoknál a medián értékkel, valamint a 25–75%-os interkvartilis tartománnyal, kategoriális változók esetén pedig százalékban adtuk meg. Kategoriális változók megoszlásának összehasonlításához χ^2 -próbát, normális eloszlású folytonos változók összehasonlításához Student-féle kétmintás t-próbát alkalmaztunk, nem normális eloszlások összehasonlítására Mann–Whitney-féle U-próbát vettünk igénybe. A statisztikai szignifikancia szintjét $p < 0,05$ -nél határoztuk meg. Számításainkat webalapú alkalmazás segítségével végeztük el (Wessa, P. 2014, Free Statistics Software, Of-

ice for Research Development and Education, version 1.1.23-r7). A mortalitási adatok feltüntetéséhez Kaplan–Meier szerinti ábrázolást választottunk.

Eredmények

Populációs jellemzők

A vizsgált féléves időszakban összesen 295 beteget kezeltünk. A tőlük származó 2062 mikrobiológiai mintát tekintettük át; Enterococcus speciést 114 betegnél azonosítottunk (62 férfi). Közülük 100-nál (51 férfi) VSE volt kimutatható, 14-nél (11 férfi) VRE. Az átlagéletkor a két csoportban hasonlóan alakult, $66,5 \pm 14,0$ év, illetve $68,4 \pm 6,6$ év volt.

A betegek társbetegségeit a két csoportban az 1. táblázat mutatja. A hipertonia és a diabetes gyakorisága a két csoportban nem volt szignifikánsan különböző, a többi társbetegsége azonban igen, a krónikus vesecélgtelenség, illetve a malignus folyamatok kivételével a VRE-csoportban voltak gyakoribbak a társbetegségek. Külön kiemelendő az akut műtétek lényegesen nagyobb aránya. Az egyes műtéttípusokat a két csoportra bontva a 2. táblázatban összesítettük.

A VSE-t, illetve a VRE-t tartalmazó mikrobiológiai minták anatómiai helyét a 3. táblázatban mutatjuk be. A VSE-t tartalmazó minták többsége hasi eredetű volt (56,9%), második helyen a sebek mikrobiológiai leoltásai (16,3%), majd pedig a véráram (7,9%) szerepelt eredetként. A VRE-k esetében azonban a (sokszor surveillance célból levett) testfelületi minták voltak többségben (56,4%), ezeket követték csak az intraabdominalis eredetű (17,9%) minták. A kitenyésztett VRE-törzsek egy eset kivételével *E. faecium*ok voltak, mind vancomycinre és teicoplaninra rezisztensnek bizonyultak (*vanA*-ra jellemző fenotípus). Egy beteg esetében *E. faecalis*t tudtunk

2. táblázat | A két betegcsoportban végzett műtétek megoszlása az érintett szervek szerint, illetve egyes kiemelt típusok aránya százalékban (zárójelben a betegek száma)

	VRE		VSE	
Nyelőcső	(2)	14,3	(5)	5,2
Gyomor	(2)	14,3	(14)	14,6
Máj és epeút	(2)	14,3	(20)	20,8
Hasnyálmirigy	(2)	14,3	(10)	10,4
Cholecystectomy	(2)	14,3	(5)	5,2
Vékonybél	(2)	14,3	(2)	2,1
Végbél- és vastagbél	(1)	7,1	(21)	21,9
Appendectomy	(0)	0,0	(1)	1,0
Egyéb intraperitonealis	(0)	0,0	(14)	14,6
Testfelület	(0)	0,0	(2)	2,1
Amputáció	(1)	7,1	(2)	2,1

3. táblázat | A pozitív mikrobiológiai minták eredetének megoszlása százalékban az egyes testtájak szerint (zárójelben a betegek száma)


Hely	VRE		VSE	
Has	(7)	17,9	(136)	56,9
Húgyút	(4)	10,3	(10)	4,2
Légút	(5)	12,8	(5)	2,1
Kanül	(0)	0,0	(14)	5,9
Véráram	(1)	2,6	(19)	7,9
Seb	(1)	2,6	(39)	16,3
Testfelület	(21)	53,8	(12)	5,0
Pleura	(0)	0,0	(4)	1,7

kimutatni, *vanB-re* jellemző fenotípussal, teicoplaninra megtartott érzékenységgel.


A betegek mintavételt megelőző kórházi tartózkodása nem különbözött szignifikánsan, a VSE-csoportban 11 nap (IQR: 4–19), a VRE-csoportban 14 nap (IQR: 9–19) volt ($p = 0,796$).

Az *Enterococcus*- és a VRE-gyakoriság változása

A vizsgált féléves időszakban az összes pozitív tenyésztési eredmény arányában az egyes hónapok során a VRE-gyakoriság jelentős változásokat mutatott (1. ábra). A VRE-k aránya március és április hónapokban kifejezetten emelkedett volt, akkor 3,4%, illetve 4,9% volt az összes pozitív tenyésztési eredmény százalékában. Március 25-től április 23-ig járványügyi intézkedések váltak szükségessé: izolációs részleget alakítottunk ki az intenzív osztályon, illetve a már onnan kihelyezhető állapotú betegek számára a sebészeti osztályon. Rendszeresen végeztük a kontakt betegek szűrését. 2013. április 2-ától 23-áig saját hatáskörben elrendelt felvételi zárlat volt az intenzív osztályon, ezzel egy időben a műtőblokk terüle-



1. ábra | Az *Enterococcus* és a VRE-k aránya az egyes hónapokban az összes pozitív tenyésztés arányában




2. ábra | A VRE- és a VSE-betegcsoport SOFA-pontszám szerinti megoszlása

tén ideiglenes posztoperatív intenzív részleget hoztunk létre csökkentett ágyszámmal. Az *Enterococcus* speciek aránya a vizsgált hónapokban a levett mintákból kitenyésztett baktériumok 11,0–18,3%-át tette ki. A járványos halmozódást megelőző (2013. január 1-jétől március 25-éig) és az azt magában foglaló (2013. március 26-ától június 30-áig) időszak adatait összevetve, a VRE-gyakoriság változása szignifikánsnak bizonyult, de a VRE halmozódása nem hozta magával az *Enterococcus* hasonló mértékű elszaporodását az intenzív osztályon kezelt betegek körében (*Enterococcus*: $p = 0,809$; VRE: $p < 0,001$).

Vancomycinrezisztencia és állapot súlyosság

A 2. ábrán mutatjuk be a VSE-vel, illetve VRE-vel érintett betegek SOFA-pontszám szerint képzett csoportok közötti megoszlását. A VSE-vel kapcsolatba került betegek legnagyobb része az alacsony (0–3) SOFA-ponttal jellemezhető csoportba tartozott. Ezzel szemben a VRE-s betegek szignifikánsan nagyobb arányban tartoztak a magasabb állapot súlyosságú csoportokba.



3. ábra | Kórházi tartózkodás napjai

Kimeneteli jellemzők

Kórházi tartózkodás


A VSE-csoport medián kórházi tartózkodása 22 nap (15–42), míg a VRE-csoportban 33 nap volt (24–47) (3. ábra). A különbség a statisztikai szignifikancia szintjét nem érte el ($p = 0,942$).

Halálozás

Betegeink kórházi halálozását a bevonás alapját képező pozitív tenyésztési eredményt követő 60. napig ábrázoljuk a 4. ábrán látható Kaplan–Meier-görbén. A VRE-csoportban 6, a VSE-csoportban 31 beteg halt meg, ez 42,9%-nak, illetve 31,0%-nak felelt meg ($p = 0,010$).

Megbeszélés

Az intenzív osztályokon szerzett nosocomialis infekciók negatív hatása a betegségkimenetelre vitathatatlan, és közismert az is, hogy nagy hányaduk multirezisztens kórokozótól származik. A kórokozó nagymértékű antibiotikum-rezisztenciája (együttesen figyelembe véve a multirezisztens és extrém rezisztens törzseket), mint önálló rizikófaktor azonban már kevésbé egyértelmű. Bár az nem lehet kérdéses, hogy az elkerülhető nosocomialis infekció veszélyt jelent a kritikus állapotú betegekre, an-



4. ábra | A két betegcsoport túlélési aránya a pozitív mintavételt követő napok szerint

nak megítélése, hogy az intenzív osztályon szerzett infekció prognózisa mennyiben változik az egyes kórokozók és azok rezisztenciáinak megléte vagy hiánya esetén, már külön-külön vizsgálendő [12]. Nehéz megítélni azt is, hogy önmagában a multirezisztens kórokozó akvirálása fokozza-e a mortalitást, vagy a nagyobb állapot súlyosságú betegek hajlamosabbak inkább ilyen infekciókra, más szóval, a kórokozó megléte inkább az állapot súlyosság egy újabb markere, amely a rosszabb kimenetelt prognosztizálja. A már idézett közleményben Lambert és munkatársai által bemutatott erős bizonyítékok alapján több kórokozó (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. coli*) esetében a nagymértékű antibiotikum-rezisztencia önálló mortalitásnövelő szerepét egyértelműnek tekinthetjük [2].

Az Enterococcus speciestek esetében a helyzet kevésbé világos [13, 14]. Hazai közlemények, illetve tapasztalatok e baktériumcsoport esetében nem állnak rendelkezésre. Saját vizsgálatunkat a VRE sajnálatos, az országos átlagot meghaladó mértékű [8], járványszerű – bár viszonylag rövid ideig tartó – halmozódása tette lehetővé. Arra a kérdéseinkre, hogy a vancomycinrezisztens törzsek megjelenése fokozza-e az Enterococcusok együttes intenzív osztályos jelenlétét, vizsgálatunk nemleges választ adott, mivel a vizsgálat során nem észleltünk szignifikáns mértékű változást a gyakoriságukban a pozitív bakteriológiai minták között.

A VRE és a VSE jelenléte esetén a pozitív minta levétele napján már észlelhető volt bizonyos különbség az állapot súlyosságban, a VRE-csoport betegek ugyanis nagyobb arányban tartoztak a magasabb állapot súlyosságú (magasabb SOFA-értékkel jellemezhető) csoportokba. A kimenetelt jellemző paraméterek közül a kórházi tartózkodás ideje nem különbözött érdemben, a halálozás azonban szignifikánsan volt magasabb a VRE-csoportban. Bár ez a megfigyelés mindenképpen figyelemre méltó, azonban nem alkalmas a VRE önálló kóroki szerepének tisztázására, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a VRE-izolátumok nagyobb arányban származtak testfelületi, így vélhetően kolonizáló flórát tartalmazó mintákból, mint a VSE-k. A magasabb mértékű mortalitás lehet a VRE-vel kezelt betegek körében gyakoribb társbetegségek következménye, illetve a közöttük gyakoribb akut sebészeti beavatkozást igénylő helyzetek velejárója is.

Vizsgálatunk hátránya az alacsony esetszám és a retrospektív elemzés. Ezzel a metodikával nem tudtuk elkülöníteni a VRE okozta kolonizációt és a fertőzést, emiatt szükségesnek gondoljuk a jövőben prospektív vizsgálatok végzését.

A *C. difficile* elterjedtsége miatti fokozódó intenzív osztályos glikopeptidhasználat hazánkban is előrevetíti a vancomycinrezisztens Gram-pozitív baktériumok terjedését, saját tapasztalatunk is megfelelt ennek; VRE-vel azonosított betegeink között magasabb volt a *C. difficile* okozta infekciók aránya, mint a VSE-csoportban. Tekintettel az ilyenkor jelentősen beszűkült eszköztárra (linezolid, amely jelenleg hazánkban csak egyedi import útján

szereshető be, illetve a nagy költségvonzatú tigeccyclin), már a jelen közlemény adatai alapján is kiemelendő a megfelelő intenzív osztályos infekciókontroll jelentősége.

Anyagi támogatás: A cikk megírása anyagi támogatásban nem részesült.

Szerzői munkamegosztás: Sz. M.: A hipotézisek kidolgozása, a vizsgálat szervezése, statisztikai elemzés, a kézirat szövegezése. Cs. Á.: A hipotézisek kidolgozása, irányító javaslatok a kézirat szövegezésére. B. A., S. S.: Részvétel a vizsgálatokban, releváns klinikai adatok gyűjtése. D. K., H. L.: Irányító javaslatok a kézirat szövegezésére. H. L.: Az idézett járványügyi intézkedések saját hatáskörű elrendelése, tanácsok a további tudományos célú feldolgozáshoz. A cikk végleges változatát valamennyi szerző elolvasta és jóváhagyta.

Érdekeltségek: A szerzőknek nincsenek érdekeltségeik

Köszönetnyilvánítás

A közlemény szerzői itt fejezik ki hálájukat dr. Antmann Katalin főorvosnőnek, a Semmelweis Egyetem Kórházhygiénés Osztálya vezetőjének, amiért rendelkezésünkre bocsátotta összesített mikrobiológiai adatbázisát, valamint a járványügyi vizsgálatok dokumentációját.

Irodalom

- [1] Hanberger, H., Arman, D., Gill, H., et al.: Surveillance of microbial resistance in European intensive care units: a first report from the Care-ICU programme for improved infection control. *Intensive Care Med.*, 2009, 35(1), 91–100.
- [2] Lambert, M. L., Suetens, C., Savey, A., et al.: Clinical outcomes of health-care-associated infections and antimicrobial resistance in patients admitted to European intensive-care units: a cohort study. *Lancet Infect. Dis.*, 2011, 11(1), 30–38.
- [3] Tabah, A., Koulenti, D., Laupland, K., et al.: Characteristics and determinants of outcome of hospital-acquired bloodstream infections in intensive care units: the EURO-BACT International Cohort Study. *Intensive Care Med.*, 2012, 38(12), 1930–1945.
- [4] Hollenbeck, B. L., Rice, L. B.: Intrinsic and acquired resistance mechanisms in enterococcus. *Virulence*, 2012, 3(5), 421–433.
- [5] Leclercq, R., Derlot, E., Duval, J., et al.: Plasmid-mediated resistance to vancomycin and teicoplanin in *Enterococcus faecium*. *N. Engl. J. Med.*, 1988, 319(3), 157–161.
- [6] Wisplinghoff, H., Bischoff, T., Tallent, S. M., et al.: Nosocomial bloodstream infections in US hospitals: analysis of 24,179 cases from a prospective nationwide surveillance study. *Clin. Infect. Dis.*, 2004, 39(3), 309–317.
- [7] NBS Annual reports. National Center for Epidemiology: Results of antibiotics resistance obtained from microbiologic surveillance in Hungary. [Nemzeti Bakteriológiai Surveillance Adatfeldolgozó Csoport. A magyarországi mikrobiológiai surveillance antibiotikum rezisztencia eredményei.] Országos Epidemiológiai Központ, Budapest, 2012. [Hungarian]
- [8] NBS Annual reports. National Center for Epidemiology: Results of antibiotics resistance obtained from microbiologic surveillance in Hungary. [Nemzeti Bakteriológiai Surveillance Adatfeldolgozó Csoport. A magyarországi mikrobiológiai surveillance antibiotikum rezisztencia eredményei.] Országos Epidemiológiai Központ, Budapest, 2013. [Hungarian]
- [9] Al-Nassir, W. N., Sethi, A. K., Li, Y., et al.: Both oral metronidazole and oral vancomycin promote persistent overgrowth of vancomycin-resistant enterococci during treatment of *Clostridium difficile*-associated disease. *Antimicrob. Agents Chemother.*, 2008, 52(7), 2403–2406.
- [10] Sethi, A. K., Al-Nassir, W. N., Nerandzic, M. M., et al.: Skin and environmental contamination with vancomycin-resistant enterococci in patients receiving oral metronidazole or oral vancomycin treatment for *Clostridium difficile*-associated disease. *Infect. Control Hosp. Epidemiol.*, 2009, 30(1), 13–17.
- [11] Vincent, J. L., Moreno, R., Takala, J., et al.: The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. On behalf of the Working Group on Sepsis-Related Problems of the European Society of Intensive Care Medicine. *Intensive Care Med.*, 1996, 22(7), 707–710.
- [12] Vincent, J. L.: Does microbial resistance matter? *Lancet Infect. Dis.*, 2011, 11(1), 3–4.
- [13] Cheah, A. L., Spelman, T., Liew, D., et al.: Enterococcal bacteraemia: factors influencing mortality, length of stay and costs of hospitalization. *Clin. Microbiol. Infect.*, 2013, 19(4), E181–E189.
- [14] Cheah, A. L., Spelman, T., Peel, T., et al.: Impact of vanB vancomycin-resistant enterococcal bacteraemia analysed as a time-varying covariate on length of hospital stay. *Epidemiol. Infect.*, 2014, 142(12), 2667–2671.

(Szabó Marcell dr.,
Budapest, Üllői út 78., 1082
e-mail: szabo.marcell86@gmail.com)